

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

Ivana Meštrovića bb, 42 000 VARAŽDIN

Tel/ 042 393 091

PRISTANAK NA OLAKŠAVANJE POROĐAJNIH BOLI METODOM EPIDURALNE ANALGEZIJE

Poštovana,

s obzirom na to da se približavate jednom od najljepših trenutaka u Vašem životu, majčinstvu, želimo Vas potanko upoznati s jednom od metoda za olakšavanje porođajnih boli, odnosno, objasniti Vam način njezina izvođenja kao i moguće komplikacije. Pažljivo pročitajte ovaj tekst, a dodatna pitanja i objašnjenja tražite od anesteziologa i ginekologa.

Epiduralna analgezija vrsta je analgezije kod koje se lokalni anestetik i/ili analgetik uštrcava u epiduralni prostor kralježničnog kanala epiduralnom iglom jednokratno ili kateterom (cjevčicom) kontinuirano, čime se blokiraju korjenovi spinalnih živaca i time prekida prijenos boli.

Indikaciju za epiduralnu analgeziju postavlja isključivo ginekolog, a izvodi ju anesteziolog i to nakon što se ispune određeni preduvjeti za njezino izvođenje (dobro uhodan porođaj, pravilni trudovi, zadovoljavajuće stanje djeteta i odgovarajuća dilatacija ušća maternice, itd.).

Prije započinjanja epiduralne analgezije potrebno je provjeriti nalaze trombocita i PV-a (protrombinskog vremena) te hidrirati roditelja s adekvatnom količinom tekućine (infuzije). Tijekom i nakon izvođenja epiduralne analgezije neophodno je učestalo mjeriti krvni tlak i frekvenciju pulsa te monitorirati (neprekidno bilježiti) srčanu akciju djeteta.

Prilikom izvođenja epiduralne analgezije potrebno je:

- postaviti roditelja u sjedeći ili ležeći bočni položaj;*
- pripremiti (oprati) mjesto uboda prema svim pravilima antiseptičnosti i sterilnosti;*
- lokalno infiltrirati kožu na mjestu uboda (između dva slabinska kralješka);*
- epiduralnom iglom punktirati epiduralni prostor;*
- kroz epiduralnu iglu uvesti kateter (cjevčicu) 3-5 cm u epiduralni prostor te nakon toga izvaditi iglu;*
- injicirati test dozu lokalnog anestetika (da se isključi mogućnost neželjenog davanja anestetika u likvor ili krvnu žilu);*
- dati predviđenu dozu lokalnog anestetika i /ili analgetika;*
- postaviti roditelja u bočni položaj (da se spriječi pritisak maternice na donju šuplju venu) te učestalo mjeriti krvni tlak i srčanu frekvenciju;*
- pratiti stupanj analgezije i po potrebi ponavljati dozu.*

NEŽELJENE POJAVE I KOMPLIKACIJE EPIDURALNE ANALGEZIJE

Kod današnjih naprednih anestezioloških postupaka i dobrog nadzora roditelje, neželjene pojave i ozbiljnije komplikacije rijetko se događaju. Međutim, nijedan medicinski postupak, pa tako ni epiduralna analgezija, nije bez izvjesnog rizika, te Vas stoga molimo da pažljivo pročitate neke od mogućih neposrednih, kao i odgođenih neželjenih pojava i komplikacija koje pri tome postupku mogu nastati:

- crvenilo i bolnost na mjestu uboda;
- prolazni bolovi u leđima;
- osjećaj trnjenja i smanjenja mišićne snage u nogama i donjem dijelu tijela;
- prolazno smanjenje srčanog tlaka i usporenje srčanog ritma djeteta;
- urinarna retencija (otežano i odgođeno pražnjenje mokraćnog mjehura);
- prolazno neinfektivno povišenje tjelesne temperature;
- postpunkcijska glavobolja (nastaje radi nehoteične punkcije tvrde ovojnice leđne moždine i izlaska i gubitka određene količine moždane tekućine-likvora);
- alergijske reakcije zbog primjene određenih lijekova;
- oštećenje živaca i prolazni ili trajni neurološki poremećaji;
- epiduralni apsces, meningitis;
- konvulzije (grčevi);
- srčani zastoj (arest).

Poštovana,

nakon što ginekolog na temelju tijeka poroda zaključi da bi primjena epiduralne analgezije pridonijela kvalitetnijem završetku poroda, razgovarat ćete s anesteziologom koji će Vam prije izvođenja epiduralne analgezije pružiti dodatne informacije o načinu njezina izvođenja i mogućim komplikacijama.

Nakon detaljnog razgovora s ginekologom i anesteziologom, i nakon što pažljivo pročitate ovaj tekst, svojim potpisom potvrdit ćete da ste informirani o indikaciji, načinu izvođenja i mogućim komplikacijama epiduralne analgezije te da pristajete na njezino izvođenje.

Ime i prezime roditelje _____

Informirana sam o metodi epiduralne analgezije i upoznata s pravilima izvođenja i komplikacijama epiduralne analgezije.

Pristajem na izvođenje epiduralne analgezije.

Potpis roditelje _____