

## IMUNOHEMATOLOŠKO PRIJETRANSFUZIJSKO TESTIRANJE

naziv pretrage	vrsta uzorka/količina	vrijeme pretrage	trajanja	vrijeme naručivanja pretrage	posebni zahtjevi
<b>križna proba</b>		<b>STUPNJEVI HITNOSTI</b>		<b>24 sata/dan</b>	
izdavanje eritrocitnog pripravka s križnom probom <ul style="list-style-type: none"> <li>- redovna križna proba (provjera ABO i RhD pacijenta i davatelja, IAT test pacijenta, križna proba)</li> <li>- hitna križna proba vitalna indikacija (provjera ABO i RhD pacijenta i davatelja, IAT test pacijenta, križna proba)</li> </ul>	Svježi uzorak venozne krvi uzet u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml. ili 3 mL Za novorođenčad uzorak od 500 µL	redovna križna proba 3 sata		24 sata/dan	-Kod pozitivnog IAT testa ili križne probe potrebno je dodatno testiranje na eritrocitna protutijela i antigen kompatibilnu krv, pa to može produžiti vrijeme za rezultat i transfuziju, -Kod hitne križne probe kada je IAT test pozitivan izdaje se krv s negativnom križnom probom bez pretrage na specifičnost protutijela
Prvi stupanj hitnosti: izdavanje eritrocitnog pripravka bez križne probe, IAT testa i određene krvne grupe vitalna indikacija <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdaju se O negativni Kell negativni eritrociti</li> <li>- AB svježe smrznuta plazma i trombociti</li> </ul>		Izdavanje odmah		24 sata/dan	Provjerava se samo ABO RhD krvna grupa doze Križna proba izvodi se naknadno
Drugi stupanj hitnosti: izdavanje eritrocitnog pripravka bez križne probe i IAT testa s određenom ABO i RhD krvnom grupom iz dva vremenski nezavisna uzorka, vitalna indikacija		Izdavanje unutar 30 minuta		24 sata/dan	Određuje se ABO RhD krvna grupa doze i pacijenta iz dva vremenski nezavisna uzorka Križna proba izvodi se

**IMUNOHEMATOLOŠKO PRIJETRANSFUZIJSKO TESTIRANJE**

<b>naziv pretrage</b>	<b>vrsta uzorka/količina</b>	<b>vrijeme pretrage</b>	<b>trajanja</b>	<b>vrijeme naručivanja pretrage</b>	<b>posebni zahtjevi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- izdaju se ABO istovjetni ili kompatibilni eritrociti</li><li>- ABO istovjetna ili kompatibilna svježe smrznuta plazma i trombociti</li></ul>					naknadno
Tipiranje doza krvi u svrhu traženja antigen kompatibilne krvi		2 do 5 sati		24 sata/dan	
Imunohematološko testiranje transfuzijske reakcije	Svježi uzorak venozne krvi uzet u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml.	2 do 5 sati		24 sata/dan	